

Complexité et Calculabilité : TD6

Décidabilité et arrêt.

6.1 Rappels

Un ensemble L (défini comme un langage sur un alphabet Σ) est *décidable* s'il existe un programme P qui pour toute entrée $n \in \Sigma^*$, s'arrête au bout d'un temps fini dans un état acceptant quand l'entrée appartient à L , et s'arrête dans un état refusant dans le cas contraire.

Par problème, on désigne ici des problèmes de décision, exprimés sous la forme :

Étant donnée une entrée n , est-ce que n satisfait une certaine propriété.

Le langage associé à un problème est l'ensemble des entrées qui satisfont la propriété. Le problème est décidable si et seulement si le langage associé l'est.

6.2 Arrêt et décidabilité

Exercice 6.1

Soit P un programme qui prend en entrée un entier (positif ou nul) et qui termine sur toute entrée, en retournant un entier positif ou nul. On s'intéresse à l'ensemble des valeurs calculées par le programme P , i.e. l'ensemble des entiers m tel que l'on ait $m = P(n)$ pour au moins un entier n . Montrez que l'ensemble des valeurs calculées par P est un ensemble décidable, dans chacun des deux cas suivants :

1. On suppose que pour toute entrée n , la fonction $P(n)$ calculée par P sur n satisfait $P(n) \geq n$.
2. On suppose que P calcule une fonction strictement croissante.

Exercice 6.2

On considère les problèmes de décision suivants sur des programmes P . (dans les deux cas, les programmes prennent en entrée un seul entier et calculent une valeur stockée dans la variable `res`) :

1. HALT_0 : est-ce que P s'arrête sur l'entrée 0 ?
2. VAL_0 : est-ce que $P(0) = 0$? (i.e., est-ce que P s'arrête sur l'entrée 0, et retourne alors la valeur 0 ?)

Justifiez que les fonctions suivantes sont bien des réductions (calculables) de HALT_0 vers VAL_0 (fonction R_1) et vice-versa (fonction R_2) :

1. R_1 définit à partir d'un programme P un nouveau programme P' comportant les instructions suivantes :

```
 $P(0)$ ;  
res := 0
```

2. R_2 définit à partir d'un programme P un nouveau programme P' comportant les instructions suivantes (où z est une nouvelle variable, et res est la variable "résultat" du programme P) :

$P(0)$;
 WHILE ($\text{res} \neq 0$) DO $z := z + 1$ OD

Exercice 6.3

Soient u et v deux mots. On écrit $u \subseteq v$ quand u peut s'obtenir à partir de v en effaçant des lettres (par exemple $aaa \subseteq ababca$). On considère le problème d'inclusion de Post qui est une version légèrement modifiée du problème de correspondance de Post :

ENTRÉE : $(u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n)$
QUESTION : Existe-t-il i_1, \dots, i_k tels que $u_{i_1} \cdots u_{i_k} \subseteq v_{i_1} \cdots v_{i_k}$?

1. Soient u, u', v et v' des mots, montrez que si $uu' \subseteq vv'$ alors $u \subseteq v$ ou $u' \subseteq v'$.
2. Montrez que si le problème d'inclusion de Post a une solution alors il a une solution de longueur 1 (*i.e.* avec $k = 1$).
3. Montrez que le problème d'inclusion de Post est décidable.

Exercice 6.4

Soit P un programme WHILE avec pour seules variables x_0 et x_1 , qui prend en entrée un entier. On sait que P satisfait l'invariant suivant :

- Sur entrée n , les valeurs de x_0 et x_1 durant l'exécution de P sont toujours inférieures à n^2 .

Décrivez un algorithme qui répond à la question suivante :

Entrée : entier n .

Question : est-ce que P s'arrête sur n ?

Exercice 6.5

Montrez que le problème suivant est indécidable :

Entrée : machine de Turing M .

Question : est-ce que M a un calcul infini sur le mot vide ?

Exercice 6.6

Dans cet exercice on veut montrer que le problème du pavage du quart de plan est indécidable. Pour ce problème on a comme entrée :

- un ensemble fini de tuiles D ,
- des contraintes horizontales $H \subseteq D \times D$ et verticales $V \subseteq D \times D$,
- une tuile initiale $d_0 \in D$.

Un pavage $p : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \rightarrow D$ du quart de plan associe à chaque position (i, j) du quart de plan une tuile $p(i, j) \in D$ tel que :

- $p(0, 0) = d_0$,
- $(p(i, j), p(i, j + 1)) \in H$ pour tous $i, j \geq 0$,
- $(p(i, j), p(i + 1, j)) \in V$ pour tous $i, j \geq 0$.

Montrez que le problème suivant est indécidable :

Entrée : $D, H, V \subseteq D \times D, d_0 \in D$.

Question : est-ce qu'il existe un pavage du quart de plan ?

Indication : Vous pouvez réduire de la question précédente, en supposant que M a une seule bande infinie à droite. Vous allez définir D, H, V de telle sorte qu'un pavage du quart de plan correspond à un calcul de M sur le mot vide : la n -ème ligne du pavage doit correspondre à la n -ème configuration du calcul. Une configuration $A_1 \cdots A_i q A_{i+1} \cdots A_n$ sera codée par le mot $A_1(A_1, A_2)(A_2, A_3) \cdots (A_{i-1}, A_i)(q, A_i, A_{i+1})(A_{i+1}, A_{i+2}) \cdots (A_{n-1}, A_n)$.