


# Théorème de Nash

.



## Retour sur équilibres et détermination des jeux

Ex Prix équitable

$p(s, m)$ : note de l'étudiant  $s$  pour la matière  $m$

- 1 le conseil des étudiants choisit un étudiant  $s$ .
- 2 le jury choisit une matière  $m$ .
- 3 le prix est  $p(s, m) \cdot 100$ .

\* CE maximise, jury minimise  
(O-jum)

Est-ce que CE a l'intérêt d'inviter (1) et (2) ?

Résultat de (1)  $\rightarrow$  (2) :

$\min_m p(s_0, m)$  : so choisi par CE

Résultat de (2)  $\rightarrow$  (1)

$\max_s p(s, m_0)$  : mo choisi par jury

Req:

$$\min_m p(s_0, m) \leq p(s_0, m_0) \leq \max_s p(s, m_0)$$

pour tout  $s_0, m_0$

On a done:

$$(*) \max_s \min_m p(s, m) \leq \min_m \max_s p(s, m)$$

||

||

$$\min_m p(s_0, m) \quad \max_s p(s, m_0)$$

Si maintenant des matchs de  
CE et jury sont faits  
simultanément, quand est-ce  
qu'ils ne rejettent pas leur  
choix ?

Si CE choisi de faire autre chose  
alors nous ne regretterons rien

$\Leftrightarrow$

$$\forall s: p(s, m_0) \leq p(s_0, m_0)$$

et

$$\forall m: p(s_0, m) \geq p(s_0, m_0)$$

$\Leftrightarrow$

$$\max_s p(s, m_0) \leq p(s_0, m_0) \leq$$

$$\min_m p(s_0, m)$$

Ce qui implique :

$$\min_m \max_s p(s, m) \leq p(s_0, m_0) \leq$$

$$\max_s \min_m p(s, m)$$

Avec  $\otimes$  on obtient :

$$\min_m \max_s p(s, m) = p(s_0, m_0) =$$

$$\max_s \min_m p(s, m)$$

Comparaison avec jeux à 2 joueurs  
à information parfaite (sans partage  
d'indices) :

jeu est déterminé si soit  $P_0$   
ou  $P_1$  a une stratégie gagnante

$\sigma_i$  : stratégie de  $P_i$

$$p(\sigma_0, \sigma_1) = \begin{cases} 1 & \text{si } P_0 \text{ gagne} \\ -1 & \text{si } P_1 \text{ gagne} \end{cases}$$

le jeu est déterminé si

$$\alpha := \max_{\sigma_0} \min_{\sigma_1} p(\sigma_0, \sigma_1) =$$

$$\min_{\sigma_1} \max_{\sigma_0} p(\sigma_0, \sigma_1) =: \beta$$

( $\Rightarrow$ ) On a toujours  $\alpha \leq \beta$  par  $\textcircled{x}$ .

Si  $P_0$  gagne avec  $\hat{\sigma}_0$  alors

$$\min_{\sigma_1} p(\hat{\sigma}_0, \sigma_1) = 1 \Rightarrow \alpha = 1$$

$$\Rightarrow \beta \leq \alpha$$

Si  $P_1$  gagne avec  $\hat{\sigma}_1$ :

$$\max_{\sigma_0} p(\sigma_0, \hat{\sigma}_1) = -1$$

$$\Rightarrow \beta = -1 \Rightarrow \beta \leq \alpha$$

Dans les 2 cas:  $\alpha = \beta$

( $\Leftarrow$ ) Si  $\alpha = \beta = 1$ :

$$\exists \hat{\sigma}_0 \text{ tq. } \min_{\sigma_1} p(\hat{\sigma}_0, \sigma_1) = 1$$

$\Rightarrow \hat{\sigma}_0$  gagnante pour  $P_0$

Si  $\alpha = \beta = -1$ : idem pour  $P_1$

Trop qu'à mathémat on a déf.  
des éq. de Nash avec stratégies  
pures ( $s_i \in S_i$ ).

Pierre - feuille - ciseaux  $\rightarrow$  choix probab.

- On va introduire des stratégies probabilistiques ("mixtes")
- On va montrer le thm. de Nash, qui dit que dans tout jeu fini il existe au moins un éq. de Nash avec strat. mixtes
- On va montrer comment calculer un éq. de Nash dans le cas spécial de 2 joueurs & zero sum :

Mimax - Hémème (von Neumann)

$A \neq \emptyset$  fini

Une distrib. de prob. sur  $A$ :

$$\text{pr} : A \rightarrow [0, 1]$$

$$\sum_{a \in A} \text{pr}(a) = 1$$

On note par  $\Delta A$  = ens. des distrib.  
de proba: sur  $A$

stratégies

$$(s_1, \dots, s_n, p_1, \dots, p_n)$$

Une strat. mixte pour le joueur  $i$

= distrib. de proba sur  $s_i$

Note:  $\Delta s_i$  = ens. des stratégies mixtes  
pour  $i$

$$m_i \in \Delta s_i$$

$$\text{supp}(m_i) = \{s \in s_i : m_i(s) > 0\}$$

$$m \in \Delta s_1 \times \dots \times \Delta s_n \rightarrow$$

$$m = (m_1, \dots, m_n) \quad m_{-i} = (m_1, \dots, \underset{i}{m_i}, \dots, m_n)$$

$$r = (s_i)_i$$

$$m(s) := m_1(s_1) \cdot m_2(s_2) \cdots m_n(s_n)$$

payoff

$$p_i(m) = \sum_{s \in S} \underbrace{m(s)}_{\in [0,1]} \cdot \underbrace{p_i(s)}_{\uparrow \text{matrix}}$$

ex Match des penates

	1 \ 2	H	T
1	H	1, -1	-1, 1
T		-1, 1	1, -1

pas d'eq. de Nash  
pure

$$m_1 = \frac{1}{2} H + \frac{1}{2} T = m_2$$

$$p_1(m) = 4 \cdot \frac{1}{4} + (-1) \cdot \frac{1}{4} + (-1) \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = 0 = p_2(m)$$

Def  $m$  est éq. de Nash si pour tout  $i$ , et pour toute strat. mixte  $m_i'$ :  $p_i(m) \geq p_i(m_i', m_{-i})$

	H	T
H	1, -1	-1, 1
T	-1, 1	1, -1

$m_1 = \frac{1}{2} H + \frac{1}{2} T =$   
 $m_2$  est l'éq. de  
 Nash

$$m_1^* = p \cdot H + (1-p) \cdot T$$

$$\begin{aligned} p_1(m_1^*, m_2) &= 1 \cdot \frac{p}{2} + (-1) \cdot \frac{p}{2} \\ &\quad + (-1) \cdot \frac{1-p}{2} + 1 \cdot \frac{1-p}{2} = 0 = p_1(m) \end{aligned}$$

[IEDDS] : iterated elimination of strictly dominated strategies

→ on élimine une stratégie pure si elle est strictement dominée par une stratégie mixte  $m_i$  :

$$p_i(s_i, m_{-i}) < p_i(m_i, m_{-i}),$$

$* m_i$

Rg. L'ordre d'élimination n'est pas important. les équilibres de Nash ne sont pas éliminés par IEDDS

Ex Pour MP, la strat. H n'est pas strictement dominée, par aucune strat. mixte  $m_1$ , car avec

$$\begin{cases} m_L = \frac{1}{2}H + \frac{1}{2}T \\ m_1 = r \cdot H + (1-r)T \end{cases} \quad \text{on a}$$

$$p_1(H, m_L) = \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$= p_1(m_1, m_L) = \frac{r}{2} + \frac{1-r}{2} - \frac{r}{2} - \frac{1-r}{2} = 0$$

Donc  $i \in S^*$  n'inclutte aucune stratégie dans MP.

lemme Pour tout jeu stratégique  
 $(S_1, \dots, S_n, p_1, \dots, p_n)$  on a  
équivalence des points suivants :

(1)  $m$  est éq. de Nash

(2) Pour tout  $1 \leq i \leq n$  et tout  
 $s_i \in S_i$  :

$$p_i(m) \geq p_i(s_i, m_{-i})$$

(3) Pour tout  $1 \leq i \leq n$  et tout  
 $s_i \in S_i \cap \text{supp}(m)$  :

$$p_i(m) = p_i(s_i, m_{-i})$$

et pour tout  $i$  et tout

$s_i \in S_i \setminus \text{supp}(m)$  :

$$p_i(m) \geq p_i(s_i, m_{-i})$$

dimo  $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (1)$

$$p_i(m) = \sum_{s \in \text{supp}(m)} m_i(s_i) \cdot m_{-i}(s_{-i}) \cdot p_i(s)$$

$$= \sum_{s_i \in \text{supp}(m_i)} m_i(s_i) \cdot p_i(s_i, m_{-i})$$

Ex Battle of sexes : possible aussi un éq. de Nash en strat. mixtes

	1	2	F	B
F			2,1	0,0
B			0,0	1,2

$$m_1 = r_1 \cdot F + (1-r_1) \cdot B$$

$$m_2 = r_2 \cdot F + (1-r_2) \cdot B$$

$$p_1(m) = 2 \cdot r_1 \cdot r_2 + (1-r_1) \cdot (1-r_2) = \frac{2}{3}$$

$$p_2(m) = r_1 \cdot r_2 + 2(1-r_1) \cdot (1-r_2) = \frac{2}{3}$$

Si  $m$  éq. de Nash :

$$\textcircled{3} \quad \text{support}(m_1) = \{F, B\}$$

$$\Downarrow p_1(m) = p_1(F, m_2) = p_1(B, m_2)$$

$$\frac{2}{3}$$

$$2r_2$$

$$1 - (1-r_2)$$

//

$$\Rightarrow 2r_2 = 1 - r_2 \Rightarrow r_2 = \frac{1}{3}$$

$$p_2(m) = p_2(m_1, F) = p_2(m_1, B)$$

$$\frac{2}{3}$$

$$r_1$$

$$2(1-r_1)$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{2}{3}$$

Ex: MP

$$m_1 = r_1 \cdot H + (1-r_1) \cdot T$$

$$m_2 = r_2 \cdot H + (1-r_2) \cdot T$$

$$\begin{aligned} p_1(m) &= r_1 r_2 + (1-r_1)(1-r_2) \\ &\quad - r_1(1-r_2) - (1-r_1)r_2 \\ &= r_1 r_2 + 1 - r_1 - r_2 + r_1 r_2 \\ &\quad - r_1 + r_1 r_2 - r_2 + r_1 r_2 \\ &= 4r_1 r_2 - 2r_1 - 2r_2 + 1 \end{aligned}$$

Si  $\text{support}(m_1) = \{H, T\}$  :

$$p_1(H, m_2) = p_1(T, m_2)$$

$$r_2 - (1-r_2) = -r_2 + (1-r_2)$$

$$2r_2 = 2(1-r_2) \Rightarrow r_2 = \frac{1}{2}$$

?  $(H, m_2)^{1/2}$  eq. de Nash?

$$\begin{aligned} p_1(H, m_2) &= r_2 - (1-r_2) = 2r_2 - 1 \\ &= 4r_1 r_2 - 2r_1 - 2r_2 + 1 \end{aligned}$$

## Th. de Nash ( $\sim 1950$ )

Tout jeu stratégique fini a au moins un éq. de Nash avec strat. mixtes.

Rq Il y a des jeux qui n'ont pas de éq. de Nash en strat. pures (ex. MP, PFC, ...).

Prouve en utilisant le Thm. de point fixe de Brouwer.

[Brouwer] : Si  $D \subseteq \mathbb{R}^d$  est convexe et compact, et  $f: D \rightarrow D$  est continue, alors il ex.  $x \in D$  tq.  $f(x) = x$ .

On déf. pour  $i \in [1..n]$ , m strat. mixte,  $s_i \in S_i$  :

$$\text{Gain}_{s_i}(m) = \max \left\{ p_i(s_i, m_{-i}) - p_i(m); 0 \right\}$$

On applique Brouwer avec

$$D = [0,1]^{S_1} \times \cdots \times [0,1]^{S_n}$$

$$\forall m \in D : f(m) = m' \text{ tq.}$$

$\forall i, \forall s_i \in S_i :$

$$m'_i(s_i) := \frac{m_i(s_i) + \text{Gain}_i(m)}{1 + \sum_{s'_i \in S_i} \text{Gain}_i'(m)}$$

$$\underline{\text{Rq}} \quad \sum_{s_i \in S_i} m'_i(s_i) = 1$$

$\underline{\text{Rq.}}$   $f$  est continue

On montre que si  $m = f(m)$ , alors  $m$  est équilibre de Nash.

Il suffit de montrer :

$$\text{Gain}_i(m) = 0, \forall i, s_i \in S_i$$

si

$$\max \{ p_i(s_i, m_{-i}) - p_i(m); 0 \}$$

$\text{Gain}_{S_i}(m) = 0$ ,  $\forall i, s_i \in S_i$ :

Supposons par contradiction qu'il existe  $i, s_i \in S_i$  tq.

$\text{Gain}_{S_i}(m) > 0$  ( $\Rightarrow p_i(s_i, m_{-i}) > \underline{p_i(m)}$ )

On note que  $\underline{m_i(s_i)} > 0$ .  
(pas possible d'avoir  $m_i(s_i) = 0$   
à cause de  $m_i'(s_i) > 0$  et  $m = m'$ )

$$f(m) = m' (=m)$$

$$p_i(m) = \sum_{s'_i \in S_i} m_i(s'_i) \cdot p_i(s'_i, m_{-i})$$

A cause de  $m_i(s_i) > 0$  et  
 $p_i(s_i, m_{-i}) > p_i(m)$ , il doit ex.

$s'_i \in S_i$  tq.  $m_i(s'_i) > 0$  et

$$p_i(s'_i, m_{-i}) < p_i(m)$$

$$(\Rightarrow \text{Gain}_{S_i'}(m) = 0)$$

$$\text{Donc } \frac{m_i(s'_i)}{m_i(s'_i)} = \frac{m_i(s'_i) + \text{Gain}_{S_i'}(m)}{1 + \sum \text{Gain}_{S_i''}(m)} <$$
$$\underline{m_i(s'_i)} \rightarrow \text{contradict } m = m' !$$

Maintenant : cas spécial 2 joueurs,  
zero-sum

- ↓  
(1)  $R$  (row)  
(2)  $C$  (column)

je décris par 2 matrices  $R, C$   
de dimension  $m \times n$ .

( $R = -C$  si somme nulle)

$$\Delta S_R = \{ \bar{x} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m : \sum x_i = 1 \}$$

$$\Delta S_C = \{ \bar{y} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n : \sum y_j = 1 \}$$

Etant données  $\bar{x}, \bar{y}$ , le payoff  
de  $R$  est  $\bar{x}^T R \bar{y}$ . ( $C$  :  $\bar{x}^T C \bar{y}$ )

$(\bar{x}, \bar{y})$  est éq. de Nash ssi'

$$\bar{x}^T R \bar{y} \geq \bar{x}'^T R \bar{y} , \forall \bar{x}'$$

$$\bar{x}^T C \bar{y} \geq \bar{x}'^T C \bar{y}' , \forall \bar{y}'$$

$R$ : max,  $C$ : min

$$\text{zero-sum} : C = -R$$

<u>E</u>	<u>E</u> : Énergie renouv.	<u>I</u> : Rédu. impôts
A: Retraites entrepôt	3, -3	-1, 1
D: Haute dépenses	-2, 2	1, -1

Si joueur R annonce la stratégie  $\bar{x}$   
 $= (x_A, x_D)$  alors joueur C obtient:

le gain espéré :

$$E(E) = -3x_A + 2x_D$$

$$E(I) = x_A - x_D$$

Valeur optimale pour C :

$$\min \{-3x_A + 2x_D, x_A - x_D\}$$

Si R doit annoncer sa stratégie  $\bar{x}$  en premier, alors le choix opt. est

$$\max_{(x_A, x_D)} \min \{ 3x_A - 2x_D, -x_A + x_D \}$$


le choix opt de R est donc la solution du pb. d'optimisation suivant :

$$\max z \quad \text{tg.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x_A - 2x_D \geq z \\ -x_A + x_D \geq z \\ x_A + x_D = 1 \\ x_A, x_D \geq 0 \end{array} \right. \quad \text{LPR}$$

$$z \leq 3x_A - 2(1-x_A) = 5x_A - 2$$

$$z \leq 1 - 2x_A$$



$$5x_A - 2 = 1 - 2x_A$$

$$x_A = \frac{3}{7}$$

$$x_D = \frac{4}{7}$$

$$z = \frac{1}{7}$$

le choix opt. de C :

max w tq.

$$\left\{ \begin{array}{l} -3y_E + y_I \geq w \\ 2y_E - y_I \geq w \\ y_E + y_I = 1 \\ y_E, y_I \geq 0 \end{array} \right. \quad \text{LPC}$$

$$\rightsquigarrow y_E = \frac{2}{7}, \quad y_I = \frac{5}{7}, \quad w = -\frac{1}{7}$$

Rg. Si R joue  $(\frac{3}{7}, \frac{4}{7})$  et

C joue  $(\frac{2}{7}, \frac{5}{7})$  alors R gagne  $\frac{1}{7}$  et C perd  $\frac{1}{7}$ .

- Si R joue  $(\frac{3}{7}, \frac{4}{7})$ , C ne peut pas gagner plus, à cause de LP<sub>R</sub>
  - Si C joue  $(\frac{2}{7}, \frac{5}{7})$ , R ne peut pas gagner plus, à cause de LP<sub>C</sub>.
- donc on a un éq. de Nash!

$$\max_{\mathbf{x}} \min_{\mathbf{y}} \mathbf{x}^T \mathbf{R} \mathbf{y} : \text{gagni maximal de } \mathbf{R}$$

$$\max_{\mathbf{y}} \min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{y} : -v- \text{ de } \mathbf{C}$$

(perte minime)

$$- \min_{\mathbf{y}} \max_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \mathbf{R} \mathbf{y}$$

$$\textcircled{*} \quad \max_{\mathbf{y}} \min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{y} =$$

$$\max_{\mathbf{y}} \min_{\mathbf{x}} (-\mathbf{x}^T \mathbf{R} \mathbf{y}) =$$

$$- \min_{\mathbf{y}} \max_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \mathbf{R} \mathbf{y}$$

Le Thm. Min-Max suivant dit que le gagni maximal de  $\mathbf{R}$  est égal à la perte minimale de  $\mathbf{C}$ .

## Le théorème Min-Max (von Neumann)

Etant donné :  $R \in \mathbb{R}^{m,n}$ ,

$$\max_x \min_y x^T R y = \min_y \max_x x^T R y$$

$\underline{\text{Lq}} \quad \max_x \min_y x^T R y$  est la sol.  
optimale de :

LPr :

$$\begin{cases} \max z & \text{tq.} \\ x^T R \geq z \cdot \bar{1}^T \\ x^T \cdot \bar{1} = 1 \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in [1, m] \end{cases}$$

En optimisation linéaire (LP) :

LP primal $\max (c^T x)$ tq. $Ax \leq b$ $x \geq 0$	LP dual $\min (b^T y)$ tq. $A^T y \geq c$ $y \geq 0$
--	---

le théorème de dualité forte :

On a  $\max_x (c^T x) = \min_y (b^T y)$

si un des deux LP a une solution optimale.

LP<sub>R</sub> a des sol., et elles sont bornées  $\rightarrow$  sol. opt. existe

Dual de LP<sub>R</sub> :  $\min z' \cdot b q.$

$$LP': \begin{cases} -y^T R^T + z' \cdot \bar{1}^T \geq 0 \\ y^T \cdot \bar{1} = 1 \\ y_j \geq 0, \quad \forall j \in [1, n] \end{cases}$$

On met  $z'' = -z'$ , et on applique C = -R pour réécrire LP' :

$$\max z'' \cdot b q.$$

$$LP_C : \begin{cases} Cy \geq z'' \cdot \bar{1} \\ y^T \cdot \bar{1} = 1 \\ y_j \geq 0, \quad \forall j \end{cases}$$

$$C = -R$$

$\frac{Rg}{1})$  L'PC est le pb. d'optimisation obtenu  
si C annonce sa stratégié en premier.

2) La valeur opt. de  $z''$  est

$$\max_y \min_x (x^T C y)$$

$$3) \max_y \min_x (x^T C y) = - \min_y \max_x (x^T R y)$$

Thm Si  $(x, z)$  est sol. opt. de LPR  
et  $(y, z'')$  est sol. opt. de L'PC,  
alors  $(x, y)$  est eq. de Nash,  
et  $z'' = -z$ .

dém 1)  $x^T R \geq z \bar{\tau}^T \Rightarrow$

$$(1) \quad \forall y: \quad x^T R y \geq z \quad (\tau = \bar{\tau}^T y)$$

2)  $C y \geq z'' \cdot \bar{\tau} \Rightarrow$

$$(2) \quad \forall x': \quad x'^T C y \geq z'' \quad \text{, donc} \\ x'^T R y \leq -z''$$

Si  $C$  jone le strat.  $y$  :

- $R$  gagne au plus  $-z'' = z$  (eq.(2))  
 $\uparrow$  (dualité)
  - $R$  gagne au moins  $z$  (eq(1))
- $\Rightarrow$  donc  $R$  gagne exactement  $z$
- $\Rightarrow x$  est le strat. opt. de  $R$

De façon analogue,  $y$  est le strat. opt. de  $C$ .

---

On peut montrer aussi :

Si  $(x, y)$  est éq. de Nash, alors  
 $(x, x^T R y)$  est sol. opt. de  $LP_R$   
et  $(y, -x^T C y)$  est sol. opt. de  $LP_C$ .

Ordre d'élimination n'est pas important.

(1) Si éliminée par  $m_i^*$ , puis

(2) .  $s_j' \rightarrow m_j'$

$$p_i(s_i, m_{-i}) < p_i(m_i^*, m_{-i}), \forall m_{-i}$$

$$\Rightarrow \exists \hat{s}_i \in \text{supp}(m_i) :$$

$$p_i(s_i, m_{-i}) < p_i(\hat{s}_i, m_{-i}), \forall m_{-i}$$

-  $j \neq i \Rightarrow (2)$ , puis (1) possible

-  $j = i \Rightarrow s_i \notin \text{supp}(m_i)$

$\exists s'_i \notin \text{supp}(m_i) : (2)$ , puis (1) possible

$\exists s'_i \in \text{supp}(m_i) :$

$$m_i^{''} := m_i [s'_i \leftarrow \hat{s}'_i]$$

$$p_i(s'_i, m_{-i}) < p_i(\hat{s}'_i, m_{-i}), \forall m_{-i}$$

$$\Rightarrow p_i(s_i, m_{-i}) < p_i(m_i^{''}, m_{-i}), \forall m_{-i}$$

Donc (2), ensuite (1') :  $s_i$  est éliminé par  $m_i^{''}$ .