


Jeu sur graphes

Arènes de jeu

$$A = (V = V_0 \cup V_1, E)$$

$V_i \subseteq V$ sommets appartenant à P_i

Parties : chemins dans (V, E)

Condition d'accessibilité $F \subseteq V$:

pour P_0

Pour gagner, P_0 doit visiter F .

Pour P_1 : le dual; P_1 doit éviter F .

P_0
accessibilité
"visiter F "

P_1
sûreté
"éviter F "

$$W_{in} = V^* F (V^* \cup V^w)$$

cond. de victoire de P_0

$$\text{Pour } P_1 : \quad (V \setminus F)^* \cup (V \setminus F)^\omega$$

\downarrow \downarrow
 chemins finis chemins
 maximaux infinis

$$\text{Cas spécial : } V_1 = \emptyset$$

\downarrow
 chemin vers F suffit pour
 gagner

(pour P_1 : v est gagnant pour P_1
 \Leftrightarrow tous les chemins aboutissant à
 v ne passent pas par F)

|| Si $V_0 \neq \emptyset$, $V_1 \neq \emptyset$ on ne peut plus raisonner sur des chemins.

Idee : "distance" de P_0 vers F

\rightarrow attracteur, chemins arrière

$X \subset V$: post(X) = successeurs directs
 des sommets de X

$$\text{post}(X) = \{v : \exists u \in X, u \rightarrow v\}$$

On va calculer $\text{Attr}^n(X)$

\uparrow
attraction de P_0 vers X

$$\text{Attr}_0^\circ(X) = X$$

$$\text{Attr}_0^{n+1}(X) = \text{Attr}_0^n(X) \cup$$

$$\{v \in V_0 : \text{post}(v) \cap \text{Attr}_0^n(X) \neq \emptyset\} \cup$$

$$\{v \in V_1 : \text{post}(v) \subseteq \text{Attr}_0^n(X)\}$$

$$\boxed{\text{Attr}_0(X) = \bigcup_{i \geq 0} \text{Attr}_0^i(X)}$$

plus petit point fixe

On montre :

$v \in \text{Altro}^i(X) \Leftrightarrow$ Il existe une stratégie
à partir de v pour atteindre X
en $\leq i$ coups.

Par induction :

$i=0 \quad : \quad$ ok (0 coups)


$i \rightarrow i+1$

$v \in \text{Altro}^{i+1}(X) \Leftrightarrow$

- soit $v \in \text{Altro}^i(X)$ (hyp. ind.)
- ou $v \in V_0$ et il existe
 $v \rightarrow w$ tq. $w \in \text{Altro}^i(X)$
- ou $v \in V_1$ et tous les
 $v \rightarrow w$ tq. $w \in \text{Altro}^i(X)$

Exemple

$$V_0 = \{0, 1, 4, 6\}$$



$$F = \{3, 4\}$$

→ stratégie d'attraction de P_0

$$\text{Attr}^0(F) = \{3, 4\}$$

$$\text{Attr}^1(F) = \{3, 4\} \cup \{0\}$$

$$\text{Attr}^2(F) = \{0, 3, 4\} \cup \{7\}$$

$$\text{Attr}^3(F) = \{0, 3, 4, 7\} \cup \{6\}$$

$$\text{Attr}^4(F) = \{0, 3, 4, 7, 6\} \cup \{5\}$$

$$= \text{Attr}^5(F) = Y$$

Nos arêtes sont fines, donc

i.e. ex. $n \leq |V|$ t.q.

$$Y := \text{Altro}^n(F) = \text{Altro}^{n+1}(F)$$

$$\text{Altro}^0(F) \subseteq \text{Altro}^1(F) \subseteq \dots$$

* On montre que Y représente les sommets gagnants de P_0 = région gagnante de P_0 : W_0

La région gagnante de P_1 : W_1

$$Y = W_0 \quad , \quad V \setminus Y = W_1$$

(les jeux d'accessibilité sont déterminés)

$$\text{Altro}_0(F) = \bigcup_{i \geq 0} \text{Altro}^i(F)$$

① $Y \subseteq W_0$:

P_0 applique dans Y la stratégie d'attracteur (pour attirer F)


② $V \setminus Y \subseteq W_1$:

$$Y = \text{Attr}_0^n(F) = \text{Attr}_0^{n+1}(F)$$

$v \notin Y$ - 2 cas

a) $v \in V_0$: $\text{post}(v) \cap Y = \emptyset$
 $\text{post}(v) \subseteq V \setminus Y$

b) $v \in V_1$: $\text{post}(v) \cap (V \setminus Y) \neq \emptyset$



$V \setminus Y$ est
pâge pour
 P_0

stratégie de pâge de
 P_1

Stratégies

$$\Gamma_0 : \begin{array}{c} V^* \\ \circlearrowleft \end{array} V_0 \rightarrow V \quad \text{pour } P_0$$
$$\Gamma_1 : \begin{array}{c} V^* \\ \circlearrowleft \end{array} V_1 \rightarrow V \quad P_1$$

historique

Rq les stratégies d'attracteur et de piège sont sans mémoire (ou positionnelles)

$$\Gamma_0 : V_0 \rightarrow V$$

$$\Gamma_1 : V_1 \rightarrow V$$

Recap 1) les jeux d'accèsibilité (pour P_0) / de sûreté (pour P_1) sont déterminés.

2) les stratégies gagnantes de P_0 (attracteur) et de P_1 (piège) sont positionnelles.

Comment calculer W_0, W_1, F_0, F_1 ?


On peut calculer W_0, W_1 en PTime,
même en $O(|V| + |E|)$

→ représentation par liste d'adj.
pre / post

PTime :

$$\text{Altro}^i(F) \rightarrow \text{Altro}^{i+1}(F) \quad O(|V| + |E|)$$

$$i = 0, \dots, |V|$$



$$\rightarrow O(|V| \cdot |E| + |V|^2)$$