


Jeu de parité

$(V_0 \cup V_1, E, p: V \rightarrow \{0, \dots, d\})$

$p(v) = \text{priorité (couleur)} \text{ de } v$

$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$ gagnée par p_0

et $\max \{ p : \exists^{\infty n} : p(v_n) = i \}$
est paire

ex  s, t, t, \dots est gagnée par p_0

On veut calculer :

$W_0 = \{ v : v \text{ gagnent pour } p_0 \}$

$W_1 = \dots$ p_1

On va montrer : ① $V = W_0 \cup W_1$

(jeux déterminés)

② stratégies gagnantes fonctionnelles

$\Gamma_i : V_i \rightarrow V$

Algorithm recursive

(Kleinaugton -
Belmonte)

Parity(G)

Input: $G = (V_0, V_1, E)$, $p: V \rightarrow \{0, \dots, d\}$

Output: (W_0, W_1)

if $V = \emptyset$ return (\emptyset, \emptyset) $i \in \{0, 1\}$

$i := d \bmod 2$;

$U := \{v \in V : p(v) = d\}$ // $U \neq \emptyset$

$A := \text{Alt}_i(U)$; // attracteur de p_i vers U

Parity(G \ A) $\rightarrow (W'_0, W'_1)$

if $W'_{1-i} = \emptyset$ then

$W_i := W'_i \cup A$. $W_{1-i} := \emptyset$

return (W_0, W_1)


else $B := \text{Alt}_{1-i}(W'_{1-i})$ // $W'_{1-i} \neq \emptyset$

Parity(G \ B) $\rightarrow (W''_0, W''_1)$

$W_i := W''_i$

$W_{1-i} := B \cup W''_{1-i}$

return (W_0, W_1)



$$i = 0$$

$$U = \{f\}$$

$$A_0 = \text{Alt}_0^G(f) = \{f, g\}$$

$$\overline{G' = G \setminus A_0} \rightarrow d = 3$$

$$i = 1$$

$$B_1 = \text{Alt}_1^G(d) \\ = \{d\}$$

$$G'' = G' \setminus B_1$$

$$\text{Parity}(G'') \rightarrow (\{c, e\}, \{a, b\})$$

$$B_2 := \text{Alt}_0(\{c, e\}) = \{c, e, d\}$$

$$G''' := G' \setminus B_2$$

$$\text{Parity}(G'') \rightarrow (\emptyset, \{a, b\})$$

$$\text{Parity}(G') \rightarrow ([c, c, d], \{a, b\})$$

$$w_1' \neq \emptyset$$

$$B_3 := \text{Attr}_1^G(\{a, b\}) = \{a, b\}$$

$$G''' := G \setminus B_3$$

$$\text{Parity}(G''') = ([c, d, e, f], \emptyset)$$

$$\text{Rib. final} \quad w_0 = \{c, d, e, f\}$$

$$w_1 = \emptyset \cup \{a, b\}$$

$$B_3 \quad w_1'' \\ = \{a, b\}$$

Complexité : $|V|=n, |E|=m$

$T_{n,m}(d)$ temps de calcul

$$T_{n,m}(d) \leq T_{n,m}(d-1) \xrightarrow{A} + T_{n-1,m}(d) + O(m+n)$$

$$T_{n,m}(d) \leq O(m \cdot n^d) \xrightarrow{B}$$

$$T_{n,m}(d) \leq T_{n,m}(d-1) + T_{n-1,m}(d) + c(m+n)$$

$$T_{n,m}(d) \leq c' \cdot m \cdot n^d$$

$$\begin{aligned} & c' \cdot m \cdot n^{d-1} + c' \cdot m \cdot (n-1)^d + c \cdot (m+n) \\ & \leq c' \cdot m \cdot n^d \end{aligned}$$

$$c' \cdot m \underbrace{(n^d - n^{d-1} - (n-1)^d)}_{\alpha} \geq c \cdot (m+n)$$

$$n^d - (n-1)^d = n^{d-1} + \underbrace{n^{d-2}(n-1) + \dots + (n-1)^{d-1}}_{\alpha}$$

Rq. Si d est fixé, la complexité est polynomiale (dans la taille de l'arête).

Rq

$$p: V \rightarrow \{1, 2\}$$

Buchi l'accèsibilité répétée

$$d = 2$$

$$i = 0$$

$$F = \{v : p(v) = 2\}$$

$$A = \text{Alt}_0(F)$$


(Parity($G \setminus A$) $\rightarrow (\emptyset, w_0', w_1')$)
[if $w_1' = \emptyset$: return $(A \cup w_0', \emptyset)$]

else $B = \text{Alt}_1(w_1')$

$$\text{Parity}(G \setminus B) \rightarrow (w_0'', w_1'')$$

$$\text{return } (w_0'', B \cup w_1'')$$

d pair



On montre par récurrence que l'algo de McNaughton - Helman calcule les équilibres géométriques

w_0, w_1 tq. $V = w_0 \cup w_1$, et que les stratégies géométriques sont positionnelles.

Supposons $i = 0$.

Cas 1 $w_1^i = \emptyset \rightarrow w_1 = \emptyset$
 $w_0 = A \cup w_0'$

σ_0 : strat. d'attracteur dans A,
et strat. pos. σ_0' sur w_0'

$$\underline{\text{Cas 2}} \quad B = \text{Attr}_1(W_1') \quad , \quad G'' = G \setminus B$$

$$\rightarrow W_0 = W_0'', \quad W_1 = B \cup W_1''$$

$\Gamma_0 \rightarrow$ strat. gagn. Γ_0'' sur W_0''

$\Gamma_1 \rightarrow$ strat. d'attracteur sur B ;

dès que le parti arrive dans

W_1' : strat. gagn. pos. Γ_1' sur W_1'

Rq $W_0'' \subseteq W_0$ avec Γ_0 :

Para que $V \setminus B$ est pâle pour P_1
 $(= V'')$

On montre que P_1 gagne sur W_1

avec Γ_1 :

a) si le parti commence dans B ,
alors elle attend forcément W_1'
et y reste : P_1 gagne avec Γ_1'

b) si le parti commence dans W_1'' :
soit elle y reste, ou elle va dans B
(P_1 gagne avec Γ_1'') \rightarrow cas a)