

$$\Psi_1 = \bigwedge_{v \in V} \left[(v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_1 \vee \bar{v}_2) \wedge (\bar{v}_2 \vee \bar{v}_3) \wedge (\bar{v}_3 \vee v_1) \right]$$

$$\Psi_2 = \bigwedge_{\substack{uv \in E \\ i \in \{1, 2, 3\}}} \left((v_1 \vee \bar{v}_1) \wedge (v_2 \vee \bar{v}_2) \wedge (\bar{v}_3 \vee \bar{v}_3) \right)$$

$\left| \begin{array}{l} G \text{ est } 3\text{-colorable} \iff \\ \Psi_G \text{ est satisfiable} \end{array} \right.$

$$c : V \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

↓

$$\text{val}_c : \{v_i : v \in V, i \in \{1, 2, 3\}\} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\text{val}_c(v_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } c(v) = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

① c est une bonne coloration de G
 \Leftrightarrow
 val_c satisfait la formule Ψ_G
par construction de Ψ_G

② Si val satisfait Ψ_G ,
alors on peut en extraire
une bonne coloration de G

val sat. Ψ_G , donc sat. Ψ_1 ,
donc pour chaque $v \in G$
il y a exactement un $i \in \{1, 2, 3\}$

$$\text{tq. } val(v_i) = 1$$

$$\rightarrow c(v) := i$$

c est bonne ol. à cause de Ψ_2