

Épisode II : Programmation linéaire

EXERCICE 1

Un agriculteur produit des concombres et des oignons. Son objectif est d'en produire un maximum (en terme de poids). Le rendement des concombres est de $4 \text{ Kg}/\text{m}^2$ et celui des oignons est de $5 \text{ Kg}/\text{m}^2$. Afin d'augmenter la production, l'agriculteur utilise deux types de fertilisants A et B . L'agriculteur dispose de 8 litres de fertilisants A et de 7 litres de fertilisants B . Concernant le fertilisant A , il en utilise $2 \text{ L}/\text{m}^2$ pour les concombres et $1 \text{ L}/\text{m}^2$ pour les oignons. Pour le fertilisant B , il en utilise $1 \text{ L}/\text{m}^2$ pour les concombres et $2 \text{ L}/\text{m}^2$ pour les oignons. Pour lutter contre les parasites il dispose de 3 litres d'anti-parasites qu'il utilise pour protéger les oignons et qu'il répartit en $1 \text{ L}/\text{m}^2$.

1. Modéliser ce problème en programme linéaire.
2. Résoudre ce problème à l'aide du Solver.

EXERCICE 2

Une entreprise fabrique deux types de parfum, P1 et P2, qui rapportent respectivement 300 euros et 500 euros par litre. Les parfums sont obtenus à partir de trois types d'essence A , B et C . L'état du stock et les quantités nécessaires à la fabrication d'un litre de chaque parfum sont donnés dans le tableau ci-dessous :

	Essence de type A (en litres)	Essence de type B (en litres)	Essence de type C (en litres)	Profit (en €/ litre)
Parfum P1	1	0	3	300
Parfum P2	0	2	2	500
Stocks	4	12	18	

Par exemple, pour fabriquer un litre de parfum P1 on a besoin d'un litre d'essence A et de trois litres d'essence C . L'objectif est de maximiser le profit.

1. Modéliser ce problème en programme linéaire.
2. Résoudre ce problème à l'aide du Solver.

EXERCICE 3

Une famille consomme six types d'aliments qui sont source d'apports en vitamine A et C . Le tableau ci-dessous indique le nombre d'unités de vitamines par Kg de produit, la demande minimale d'apport en vitamines et le prix au Kg de chaque aliment. L'objectif est de minimiser le coût total.

	Aliment 1 (en u/Kg)	Aliment 2 (en u/Kg)	Aliment 3 (en u/Kg)	Aliment 4 (en u/Kg)	Aliment 5 (en u/Kg)	Aliment 6 (en u/Kg)	Demande (en unités)
Vitamine A	1	0	2	2	1	2	9
Vitamine C	0	1	3	1	3	2	19
Prix au Kg	35	30	60	50	27	22	

1. Modéliser ce problème en programme linéaire.
2. Résoudre ce problème à l'aide du Solver.

EXERCICE 4

Production de vins (G. Finke)

Dans une distillerie américaine on produit trois sortes de vin allemands authentiques : Heidelberg sweet, Heidelberg regular et Deutschland extra dry. Les produits de base, la main d'œuvre et le profit par gallon sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

	raisin - type A (boisseau)	raisin - type B (boisseau)	sucré (kg)	main d'œuvre (heures)	profit (€)
Heidelberg sweet	1	1	2	2	10
Heidelberg regular	2	0	1	3	12
Deutschl. extra dry	0	2	0	1	20

La distillerie possède 150 boisseaux de raisin de type A, 150 boisseaux de raisin de type B, 80 kg de sucre et peut fournir 225 heures de travail.

Quelles quantités faut-il produire de ces trois vins pour obtenir un profit maximum ? Formuler ce problème en programme linéaire puis le résoudre en utilisant le Solver d'Excel.

EXERCICE 5

Compagnie aérienne (traduit de Hillier et Lieberman)

Une compagnie aérienne, en pleine expansion, est en train d'organiser son service clientèle et a besoin de savoir le nombre d'employés dont elle aura besoin pour les prochaines années. L'équipe RO doit donc étudier les besoins pour déterminer le nombre minimum de personnel nécessaire afin de satisfaire les demandes des clients. Basé sur l'ordonnancement des vols, un nouveau planning du personnel est préparé pour les différents créneaux horaires de la journée. Les informations nécessaires pour la planification sont données dans le tableau suivant.

Créneaux	Créneaux couverts					Nb min pers
	poste 1	poste 2	poste 3	poste 4	poste 5	
6h-8h	x					48
8h-10h	x	x				79
10h-12h	x	x				65
12h-14h	x	x	x			87
14h-16h		x	x			64
16h-18h			x	x		73
18h-20h			x	x		82
20h-22h				x		43
22h-24h				x	x	52
24h-6h					x	15
Coût/1j,1p	170 €	160 €	175 €	180 €	195 €	

Chaque employé doit travailler 8h par jour et 5 jours par semaine. Les postes autorisés comprennent les créneaux suivants (montré aussi dans le tableau par des croix) :

Poste 1 : 6h à 14h

Poste 2 : 8h à 16h

Poste 3 : 12h à 20h

Poste 4 : 16h à 24h

Poste 5 : 22h à 6h

Pour chaque poste, le coût associé est donné dans la dernière ligne du tableau (Coût/1j,1p : Coût pour une journée, pour une personne). La question est de savoir combien d'employés il faut affecter dans chaque poste, chaque jour, afin de minimiser le coût total du personnel et en respectant le nombre minimum du personnel nécessaire (dernière colonne dans le tableau).

Modéliser ce problème en programme linéaire puis le résoudre en utilisant le Solver.