Exemple. Soit $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ l'espace associé au tirage d'un dé à 8 faces avec la probabilité uniforme $\frac{1}{8}$. Soient :

$$A_1 = \{1,2,3,4\}$$

$$A_2 = \{1,2,5,6\}$$

$$A_3 = \{3,4,5,6\}$$

On a :

$$Pr(A_1 \cap A_2) = Pr(\{1,2\}) = \frac{1}{4} = Pr(A_1)Pr(A_2)$$

$$Pr(A_1 \cap A_3) = Pr(\{3,4\}) = \frac{1}{4} = Pr(A_1)Pr(A_3)$$

$$Pr(A_2 \cap A_3) = Pr(\{5,6\}) = \frac{1}{4} = Pr(A_2)Pr(A_3)$$

Indépendance

Définitions

- Deux événements A et B sont dit *indépendants*, si :

$$Pr(A \cap B) = Pr(A)Pr(B).$$

- Une famille $A_i, i+1, ..., n$, d'événements est dite *indépendante dans son ensemble*, si pour tout sous-ensemble $J \subset \{1, ..., n\}$:

$$Pr\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} Pr(A_i).$$

Remarque. Pour démontrer l'indépendance d'une famille $A_i, i = 1, ..., n$, il ne suffit pas de prouver que les A_i sont 2-à-2 indépendants, comme le montre l'exemple suivant.

Or :

$$Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = Pr(\emptyset) = 0 \neq Pr(A_1)Pr(A_2)Pr(A_3) = \frac{1}{8}.$$

****

Probabilités Conditionnelles

Il arrive que la donnée d'un événement modifie la probabilité initialement affectée à un autre. La notion de probabilité conditionnelle est introduite afin de formaliser le concept de la probabilité de l'occurrence d'un événement B sachant qu'un autre A s'est produit.

Notons tout de suite que B conditionné par A *n'implique pas* que A précède nécessairement B (dans l'ordre chronologique).

Exemple. Un dé uniforme est lancé et nous savons que le point obtenu est pair (événement A). Quelle est la probabilité pour que le point soit au moins 4 (événement B) ?

Nous avons alors :

$$Pr(A \cap B) = Pr(B/A)Pr(A).$$

Nous disons alors que l'on a *effectué un conditionnement par A*.

Dans le cas où $Pr(A) \neq 0$, l'indépendance de A et B est équivalente à $Pr(B/A) = Pr(B)$; ce qui est en accord avec sa définition intuitive

Proposition. Le couple $(A, Pr(./A))$ est un espace probabilisé discret.

Proposition. Soit $A_1, ..., A_n$ une partition de Ω. Si chacun de ces ensembles est de probabilité non nulle, alors :

$$Pr(B) = \sum_{i=1}^{n} Pr(A_i)Pr(B/A_i), \ \forall B \in \mathcal{P}(\Omega).$$

Il est clair que le nouvel espace (conditionné par l'événement A) sur lequel les événements élémentaires sont à définir est $\Omega' = A$, qui contient 3 éléments. Or, la portion de A qui est en même temps favorable à B en contient 2. Il est donc raisonnable de définir la probabilité de B conditionné par A par le ratio $\frac{2}{3}$ (à comparer avec $Pr(B) = \frac{1}{2}$).

Définitions. Soit (Ω, Pr) un espace probabilisé discret et soit A un événement de probabilité non nulle. On définit sur $\mathcal{P}(\Omega)$, l'application $Pr(./A)$ à valeurs dans $[0, 1]$ par :

$$Pr(B/A) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(A)}, \quad \forall B \in \mathcal{P}(\Omega).$$

On appelle $Pr(B/A)$ *probabilité conditionnelle de B sachant A* (ou *probabilité de B sachant A*).

Exemple. On lance deux dés uniformes.

- Quelle est la probabilité d'avoir obtenu un double sachant que la somme des points vaut 8 ?
- Quelle est la probabilité d'avoir obtenu un double sachant que la somme des points vaut au moins 10 ?

Solution : Chacune de ces probabilités conditionnelles est définie par une fraction dont le numérateur est la probabilité de l'intersection et le dénominateur celle de la condition. On trouve facilement :

- $Pr(\text{double}/S = 8) = \frac{1/36}{5/36} = \frac{1}{5}$.
- $Pr(\text{double}/S \geq 10) = \frac{2/36}{6/36} = \frac{1}{3}$.

Probabilité des Causes

Soit l'événement B causé par l'un des événements $A_1, A_2, ..., A_n$, tous de probabilité non nulle. On connaît les probabilités $Pr(A_i)$ de ces derniers événements et aussi les probabilités conditionnelles $Pr(B/A_i)$. Comment trouver les probabilités des causes sachant que B s'est produit, i.e. les probabilités $Pr(A_i/B)$?

Théorème (Formule de Bayes). Soit $A_1, ..., A_n$ une partition de Ω telle que $Pr(A_i) \neq 0, \forall i = 1, ..., n$. Soit B un événement de probabilité non nulle. Nous avons :

$$Pr(A_i/B) = \frac{Pr(A_i)Pr(B/A_i)}{\sum_{i=1}^{n} Pr(A_i)Pr(B/A_i)}, \ i = 1, 2, ..., n$$

Exemple (F. Dress). Dans un jeu télévisé, un candidat doit choisir une question de repêchage en tirant au hasard parmi 3 papiers. Il y a :

- une question facile avec 3 chances sur 4 de donner la réponse correcte,
- une question moyenne avec 2 chances sur 5 de donner la réponse correcte, et
- une question difficile avec 1 chance sur 5 de donner la réponse correcte.

Sachant que le candidat a donné la réponse correcte, quelle est la probabilité pour qu'il s'agisse de la question facile ?

En particulier, pour deux événements A et B de probabilité non nulle, nous avons :

$$Pr(A/B) = \frac{Pr(A)Pr(B/A)}{Pr(B)}.$$

- $Pr(A)$: *probabilité a priori de* A
- $Pr(A/B)$: *probabilité a posteriori de* A

Solution : Désignons par F, M et D les événements tirage de la question facile, de la question moyenne et de la question difficile respectivement. Soit, par ailleurs, l'événement "réponse correcte" noté par C.

D'après la formule de Bayes, nous avons :

$$Pr(F/C) = \frac{Pr(F)Pr(C/F)}{Pr(C/F)Pr(F) + Pr(C/M)Pr(M) + Pr(C/D)Pr(D)},$$

ce qui vaut :

$$\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}} = \frac{5}{9}.$$

Loi Conjointe

Dans la suite, nous considérons un couple de v.a., mais l'étude s'étend à un nombre quelconque de v.a.

Définitions. Soient X et Y deux v.a. réelles sur le même espace Ω. Le couple (X, Y) peut être considéré comme un vecteur aléatoire sur Ω. Sa loi est appelée *loi conjointe* de (X, Y). La connaissance de cette dernière permet de retrouver la loi de X et celle de Y individuellement. En effet, pour tout ensemble $A \subset X(\Omega)$ et tout ensemble $B \subset Y(\Omega)$:

$$Pr_1(X \in A) = Pr(X \in A, Y \in \mathbb{R})$$

et

$$Pr_2(Y \in A) = Pr(X \in \mathbb{R}, Y \in B).$$

A. On reprend la pièce et on la repose sur la même face.
B. On la relance indépendamment du premier lancer.

Les lois conjointes sont données par :
A. $Pr(\{F,F\}) = Pr(\{P,P\}) = \frac{1}{2}$ et $Pr(\{F,P\}) = Pr(\{P,F\}) = 0$.
B. $Pr(\{F,F\}) = Pr(\{P,F\}) = Pr(\{F,P\}) = Pr(\{P,P\}) = \frac{1}{4}$.
Il s'agit donc de deux lois distinctes

Les lois marginales dans les deux cas sont données par :

$$Pr(\{P\}) = Pr(\{F\}) = \frac{1}{2}.$$

Pour deux lois conjointes distinctes, on a les mêmes lois marginales.

X et Y sont dites *indépendantes*, si pour tout ensemble $A \subset X(\Omega)$ et tout ensemble $B \subset Y(\Omega)$:

$$Pr(X \in A, Y \in B) = Pr_1(X \in A) Pr_2(Y \in B).$$

Les distributions Pr_1 et Pr_2 sont appelées *lois marginales* du vecteur (X,Y). Dans la suite, nous supprimons les indices de Pr lorsqu'il n'y a pas le danger de confusion. La connaissance des lois marginales ne permet pas de reconstruire la loi conjointe.

Exemple. On lance une pièce authentique une première fois. Pour le 2e lancer, on considère deux possibilités :

Espérance Conditionnelle

Soit X une v.a. et soit A un événement de probabilité non nulle. L'*espérance de X sachant A* est définie par :

$$\mathbb{E}(X/A) = \mathbb{E}_{Pr(./A)} X$$

ou :

$$\mathbb{E}(X/A) = \frac{1}{Pr(A)} \sum_{\omega \in A} X(\omega) Pr(\{\omega\}).$$

Exemple. Quelle est l'espérance d'un dé uniforme sachant que le nombre sorti est inférieur ou égal à 3 ?

Solution : Soit X la v.a. associée au lancer du dé. L'événement A associé à la condition est l'ensemble $\{1,2,3\}$. La probabilité de la condition A est $\frac{1}{2}$. L'espérance conditionnelle recherchée vaut :

$$\mathbb{E}(X/A) = \frac{1}{\frac{1}{2}} [\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6}] = 2.$$